



辣根过氧化物酶标记马抗山羊 IgG (H+L)

Horseradish Peroxidase (HRP)-conjugated Horse Anti-Goat IgG (H+L)

品名: 辣根过氧化物酶标记马抗山羊 IgG(H+L)

目录号: IH-0052

规格: 2.0ml

浓度: 1.0 mg/ml

缓冲液: 10mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH7.5, 0.05%硫柳汞

储存: 冷藏(2-8℃); 不要冷冻。

推荐使用浓度: 1:200~1:2000

与其他免疫球蛋白的交叉反应率

蛋 白	交 叉 反 应 率
绵羊 IgG	50%
牛 IgG, 绵羊 IgM	25%
山羊 IgM	12%
牛 IgM	6%
豚鼠/猪 IgG	3%
猫/鸡/狗/仓鼠/人/小鼠/大鼠/兔/恒河猴/IgG	<1%
狗/豚鼠/人/小鼠/大鼠/猪 IgM	

备 注:

- 1、如果目标组织中含有和此抗体具有交叉反应的内源性免疫球蛋白, 可在抗体稀释液中加入 2%的该种属正常血清, 以消除非特异性反应。
- 2、叠氮化钠是辣根过氧化物酶的抑制剂, 不可和本产品一起使用。
- 3、使用时, 应按所需的浓度将此溶液进行稀释, 但应注意, 应现用现配, 因为稀释后的溶液中抗体及酶的有效活性会很快降低。

使用前请低速离心, 以免挂壁!